


PARVOVIRUSINĖ INFEKCIJA

Kas yra parvovirusas ir kaip nuo jo apsisaugoti??

Susergama praėjus 5–15 dienų nuo užsikrėtimo. Vaikams B19 parvovirusinė infekcija dažniausiai pasireiškia kaip infekcinė eritema (odos paraudimas dėl uždegimo). Iki bėrimo gali būti neaukšta temperatūra. Iš pradžių parausta skruostai, vėliau atsiranda rožinių dėmelių ir papulių (standus odos iškilimas). Išberiamos galūnės ir liemuo. Blykstant bėrimo elementams iš centro, susidaro tinklelį ar nėrinius primenantis vaizdas. Jis laikosi 1–2 savaites.



Skiepų nuo šio viruso nėra, todėl rekomenduojama laikytis kasdienių prevencinių priemonių:



dažnai plaukite rankas muilu ir vandeniu, kosėdami ar čiaudėdami užsidenkite burną ir nosį



venkite neplautomis rankomis liesti akis, nosį ir burną




venkite artimo kontakto su sergančiais žmonėmis, likite namuose, kai sergate

Dažniau pasitaiko vaikams nei suaugusiems

Parvovirusas B19 gali plisti nuo žmogaus žmogui per kvėpavimo takų lašelius, per kraują arba kraujo produktus, nėštumo metu (nuo motinos kūdikiui).

Asmuo yra labiausiai užkrečiamas ankstyvoje infekcijos stadijoje, kai pasireiškia karščiavimas arba į peršalimą panašūs simptomai. Pasireiškus vėlesniems simptomams (bėrimui, sąnarių skausmui) užkrečiamumo tikimybė maža, todėl dažniausiai saugu grįžti į darbą ar mokyklą.



Liga pavojinga besilaukiančioms moterims, imlioms šiam virusui, kurios yra iki 20 nėštumo savaitės, virusas gali sukelti persileidimus arba vaisiaus vandenligę. Taip pat šis virusas yra pavojingas asmenims, turintiems kraujo ligas sutrikimų, imunosupresinės būklės asmenims. Apie 20 proc. atvejų yra besimptomiai.



*Parvovirusinė infekcija nėra įtraukta į Užkrečiamųjų ligų ar susijusių specialiųjų sveikatos problemų, registruojamų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašą (1 priedas *Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.), todėl gydytojai, įtarę ir/ar nustatę šią infekciją neturi pareigos teikti informacijos NVSC. Tad informacijos apie sergamumą šia infekcija mastą Lietuvoje nėra.*